

除菌・抑制、不活化効果 確認試験

<試験品>LFIRJO40-29N50P8A

試験菌／ウイルス	照度 (Lux)	観察時間別コロニー数／ウイルス力価減少率（注1）						
		5h	6h	8h	12h	24h	48h	72h
緑膿菌	1000	87%	－	94%	98%	99%	－	－
黄色ブドウ球菌	1200	95%	－	96%	98%	99%	－	－
大腸菌	1300	－	－	－	－	47%	75%	77%
O157	1800	－	－	－	－	71%	74%	97%
リステリア菌	1300	－	－	－	－	33%	91%	97%
新型コロナ ウイルス	700	－	84.2%	－	99.4%	－	－	－
	1300	－	90.0%	－	99.6%	－	－	－
インフルエンザ ウイルス	700	－	84.2%	－	99.7%	－	－	－
	1300	－	90.0%	－	99.9%	－	－	－
ノロウイルス（注2）	700	－	－	－	99.7%	－	－	－
	1300	－	－	－	99.9%	－	－	－
黒カビ	700	－	－	－	－	23%	73%	87%
青カビ	700	－	－	－	－	16%	38%	88%

（注1）試験開始時と比較した減少率です。

（注2）ネコカリシウイルスで代替検証

＊ 検査機関：株式会社食環境衛生研究所

＊ 記載している各検査結果は、試験環境および条件での効果であり、全ての環境下でのウイルス不活化、除菌効果を保証するものではありません。また、全てのウイルス・細菌への効果は検証していません。照度により効果は変わります。